

# GK Erika

## mohar | korai

Madáreleségnek és szálatakarmánynak egyaránt alkalmas, korai fajta.

### Főbb jellemzők

Magtermőképessége	főnövényként 3,0-4,0 t/ha, másodvetésben 1,5-2,0 t/ha
Zöldhozama	főnövényként (2 növendék) 40-50 t/ha, másodnövényként 15-25 t/ha
Bokrosodó képessége	kiváló
Szárazságtűrése	kiváló, az aszályos időszak után gyorsan regenerálódik
Szemtermése	okkersárga színű
Ezermagtömege	2,5-2,8 g
Sortávolság és vetőmagszükséglet - magtermésnek	széles (24 vagy 36 cm-es) sortáv, 500 csíra/m <sup>2</sup> vetőmagmennyiség
Sortávolság és vetőmagszükséglet - szálatakarmánynak	12 cm-es sortáv, 800 csíra/m <sup>2</sup> vetőmagmennyiség

kiemelkedő

szárazságtűrés

# Oberon

## pohánka | korai

Humán táplálkozásra alkalmas fajta. A hagyományos felhasználás mellett lisztjéből kenyér és sütemény is süthető. Lisztérzékenyek is fogyaszthatják. Fontos gyógyszeripari alapanyag, kiváló mézelő növény.

### Főbb jellemzők

Magtermőképessége	főnövényként 1,5-2,0 t/ha, másodvetésben 1,0-1,5 t/ha
Szemtermése	sötétbarna színű, szárnyas
Betegség tolerancia	kiváló, kémiai növényvédelmet nem igényel, a biotermesztés ideális növénye
Vetésidő	május 15. - július 15. Fagyérzékenysége miatt a tavaszi fagyok után kell vetni és az őszi fagyok előtt betakarítani.
Vetőmagszükséglet	használati értéktől függően 50-70 kg/ha

kiváló

kórtani tulajdonságok

emberi

táplálkozásra alkalmas

