



ESO

Jó alkalmazkodóképessége miatt igen kelendő, féllevélkés típusú, középérésű száraz kifejtőborsó étkezési, illetve takarmányozási célra. Jó szárállóságú, bőtermő, könnyen termesztendő fajta.

TERMÉSHOZAM

3,0 - 5,0 t/ha

Mány	2,91 t/ha
Bedekér	4,35 t/ha

2021. évi terméseredmények

JELLEMZŐ MINŐSÉG

> Típus	féllevélkés (afila)
> Virág szín	fehér
> Hasznosítás	takarmány, étkezési
> Mag	egyöntetű sárga színű, gömbölyű
> Ezerszemtömeg	210 - 250 g
> Nyersfehérje-tartalom	21 - 22 %
> Tripszin-inhibitor-aktivitás	3,7 - 4,4 %

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

Aszkohitás foltosság	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Botritiszes megbetegedés	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Borsórozsdá	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Borsólisztharmat	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Borsóperonoszpóra	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TERMESZTÉSI JAVASLAT

Vetése az időjárás, illetve a talajállapot függvényében február közepe és március közepe között javasolt 1,0-1,1 millió csíra/ha normával. Jól tűri a tavaszi szárazabb viszonyokat és az alacsonyabb hőmérsékletet. Borsólevéltetű és tripsz, valamint a gombabetegségek ellen a preventív védekezést javasoljuk betervezni. Közepes (70-90 cm) növénymagasságot fejleszt, mely betakarításra mintegy 60 cm-re esik vissza.



AVATAR

Uj, kiváló emészthetőségi tulajdonságokkal bíró, középkorai szárazborsófajta. Igen kedvező használati értékét a nagy termés és az alacsony tripszin-inhibitor aktivitás adja.

TERMÉSHOZAM

3,0 - 5,0 t/ha

Prügy	4,81 t/ha
Mány	3,38 t/ha

2021. évi terméseredmények

JELLEMZŐ MINŐSÉG

> Típus	féllevélkés (afila)
> Virág szín	fehér
> Hasznosítás	takarmány, étkezési
> Mag	egyöntetű sárga színű, kissé hengeres
> Ezerszemtömeg	265 g (közepesen nagy)
> Nyersfehérje-tartalom	22 - 23 %
> Tripszin-inhibitor-aktivitás	2,6 % (nagyon alacsony)

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

Aszkohitás foltosság	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Botritiszes megbetegedés	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Borsórozsdá	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Borsólisztharmat	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Borsóperonoszpóra	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TERMESZTÉSI JAVASLAT

Javasolt vetési norma 0,9-1,0 millió csíra/ha. Ajánlott vetésideő február 20 – március 20 közé tehető. Gyors kezdeti fejlődésű, növényállománya magas (kb. 91 cm). Közepesen ellenálló a borsó gombabetegségeivel és a gyökérmegbetegedésekkel szemben, sőt a vírusok is kevésbé károsítják. A gombabetegségek ellen egy preventív fungicid kezelés betervezését javasoljuk. Betakarítás előtt átlagos-jó szárállósággal rendelkezik.