

- NAGY TERMŐKÉPESSÉG
- TUVV REZISZTENCIA
- FÓMA, VERTICILIUM, CILINDROSPÓRIUM ELLENI VÉDELEM (EGÉSZSÉGES SZÁR)
- KIPERGÉS ELLENÁLLÓSÁG



Őszel a kezdeti fejlődése dinamikus. Érdemes megvárni az optimális magágy készítésre és a vetésre alkalmas talajállapot kialakulását. A hirtelen szármegnyílás elkerülése érdekében ajánlott a tavaszi nitrogén fejtrágyát kisebb adagokban megosztva - az állomány fejlettségének figyelembe vételével - kijuttatni. Regulátoros kezelés javasolt. Fómával és további szárbetegségekkel - Verticilliummal és Cilindrospóriummal - szemben is jó ellenállósággal rendelkezik.

A termésképzés, szemtelítődés és érés folyamata gyors, ezért jó eséllyel kerülül el a nyár eleji aszályos időszak terméscsökkenő hatását.

Kipergés ellenállóságának köszönhetően rugalmasabban időzíthető az aratás, kevesebb betakarítási veszteségre lehet számítani.



ÖNNEK AJÁNLUK,

- ha az átlagosnál korábban virágzó és korábban betakarítható hibridre van szüksége, de emiatt nem akar kompromisszumot kötni a termés rováására,
- ha fontos, hogy a hibrid védett legyen még a ritkábban előforduló betegségekkel szemben is,
- ha szeretné elkerülni a tarlórépa sárgaság vírus termés- és olajtartalom csökkentő hatását.


TERMÉS ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐK		
Termőképesség	kiváló	
Olajtartalom	közepes	
Ezermagtömeg	nagy	
AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK		
Kezdeti fejlődés erő	nagyon jó	
Télállóság	jó	
Tavaszi újraindulás	korai	
Virágzás kezdete	közép-korai	
Érés ideje	korai	
Növény magasság	magas	
Állóképesség	átlagos	
Kipergés-ellenállóság	nagyon jó	
Gyomirtó szer rezisztencia	nem	
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG		
Fóma	ellenálló	
Fóma rezisztencia típusa	Rlm7 gén	
Tarlórépa sárgaság vírus (TuVv)	ellenálló	
Verticillium	jó	
Cilindrospórium	nagyon jó	
Gyökérgolyva	nem	

INTENZÍV KORAI !

Magyarországon már két év pozitív eredménye (2020., 2021.) alapján állami elismerésben részesült. A regisztrációs kísérletekben a népszerű középerősű hibrideknél is nagyobb terméseredményeket produkált.


Termése 2020-ban 0,50 t/ha-al, 2021-ben 0,59 t/ha-al, haladta meg a szten-derdek átlagát.

Az LG AUCKLAND termése a sztenderd hibridekhez viszonyítva



(Készült: NÉBIH közpistarapce kisparcellás fajtaszerkesztési kísérletek, korai érésű csoport, 2020-2021 átlaga alapján)

Az LG AUCKLAND terméseredményei hazai fejlesztési kísérleteinkben.



(Nettó termés 9% nedvességtartalomra számolva.)