



IMPULS

Középérésű szárazborsó. Jó szárállóságú, magas fehérjetartalmú, egyúttal betegségekkel szemben a legjobb ellenálló képességgel rendelkezik a zöld magszínű fajták között.

TERMÉSHOZAM

3,0 - 5,0 t/ha

Veszprémfajsz

4,18 t/ha

2021. évi terméseredmények

JELLEMZŐ MINŐSÉG

› Típus	féllevélkés (afila)
› Virágszín	fehér
› Hasznosítás	takarmány, étkezési
› Mag	zöld, sima felületű, egyöntetűsége kiegyensúlyozott
› Ezerszemtömeg	240 - 270 g (közepesen nagy)
› Nyersfehérje-tartalom	22 - 23 %
› Tripszininhibitor-aktivitás	3,6 - 3,7 %

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

Aszkohitás foltosság	
Botritiszes megbetegedés	
Borsórozsda	
Borsólisztharmat	
Borsóperonoszpóra	

TERMESZTÉSI JAVASLAT

Vetése az időjárás, illetve a talajállapot függvényében február közepétől ideális, és legkésőbb március közepéig érdemes elvégezni. Javasolt vetőmagnormája 1,0-1,1 millió csíra/ha, átlagosan 260 kg/ha. A növények közép magasak (60-90 cm), betakarításkor állománymagassága várhatóan 50-70 cm.



PEPS

Középkorai érésű, zöld magszínű szárazborsó. Különlegessége az őszi borsókhoz hasonlóan kicsi magméret és ezerszemtömeg. Bőtermő, értékes beltartalmú, jó állóképességű fajta.

TERMÉSHOZAM

3,0 - 5,0 t/ha

Jászberény

3,65 t/ha

Jászberény

4,28 t/ha

2021. évi terméseredmények

JELLEMZŐ MINŐSÉG

› Típus	féllevélkés (afila)
› Virágszín	fehér
› Hasznosítás	takarmány, étkezési
› Mag	zöld, sima felületű, nagyon jó egyöntetűségű, hengeres alakú
› Ezerszemtömeg	170 - 210 g
› Nyersfehérje-tartalom	22 - 24 %
› Tripszininhibitor-aktivitás	2,5 - 3,2 % (alacsony)

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

Aszkohitás foltosság	
Botritiszes megbetegedés	
Borsórozsda	
Borsólisztharmat	
Borsóperonoszpóra	

TERMESZTÉSI JAVASLAT

Javasolt vetési ideje talajállapot függvényében február közepétől március közepéig terjed, 1,0-1,1 millió csíra/ha vetőmagnormával. Növénymagassága közepes, gyors kezdeti fejlődése van, és nagyon jó a szárállósága. Kiegyenlített egészségi állapot jellemzi.



MARTON GENETICS

