



## DANKOWSKIE DIAMENT

Fehérjében gazdag termés, jó bokrosodó- és állóképesség jellemzi, ezért szemes- vagy zöldtakarmánycélú vetése akár extenzív körülmények között is sikeres.

### POTENCIÁLIS TERMŐKÉPESSÉG

5,5 - 6,5 t/ha

Hódmezővásárhely	5,98 t/ha
Szekszárd	6,24 t/ha
Salonta	5,94 t/ha

2021. évi terméseredmények

### JELLEMZŐ MINŐSÉG

> Ezerszemtömeg	23 - 30 g
> Nyersfehérje-tartalom	9,0 - 13,0 %
> Hektolitertömeg	72 - 78 kg
> Esésszám	magas

### BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

Lisztharmat	●●●●●●●●
Levélfoltosság	●●●●●●●●
Szárrozsda	●●●●●●●●
Barnarozsda	●●●●●●●●

### TERMESZTÉSI JAVASLAT

Javasolt vetésideje szeptember 15 - október 5 közötti, 4,0-4,5 millió csíra/ha vetőmagnormával. Tulajdonságai alapján ökológiai termesztésre is alkalmas.



## KWS MERIDIAN

Nagy termőképességű és termésstabilitású, kiváló betegségtoleranciával bíró takarmányárpa. Országos elterjedt, élenjáró, intenzív termesztésre ajánlott fajta.

### POTENCIÁLIS TERMŐKÉPESSÉG

9,0 - 10,0 t/ha

Szerencs	8,87 t/ha
Karcag	10,50 t/ha
Cegléd	9,21 t/ha

2021. évi terméseredmények

### JELLEMZŐ MINŐSÉG

> Kalásztípus:	hatsoros
> Ezerszemtömeg:	41 - 49 %
> Hektolitertömeg:	66 - 68 kg
> Nyersfehérje-tartalom:	12,7 - 13,4 %

### BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

Lisztharmat	●●●●●●●●
Levélorzsda	●●●●●●●●
Hálózatos levélfoltosság	●●●●●●●●
Rinospóriumos levélfoltosság	●●●●●●●●

### TERMESZTÉSI JAVASLAT

Nagy tápanyagigényű, intenzív fajta, magas N-ellátottság esetén javasolt a növekedésszabályozása. Ideális vetési ideje október 2. dekádjáig terjed, optimális vetőmagnormája 4,0-4,2 millió csíra/ha. Termesztése korai, szeptemberi vetésben is sikeres lehet, amennyiben a levéltetű- és kabócakártétel elleni védekezés minden esetben megtörténik.

