

# ORCHESTRA

Szárnyaló produktivitás és termésstabilitás



## Előnyök:

- közép-korai érésidő, nagyon stabil és nagy termőképesség
- közepesen magas növények, jó állóképességgel és szárszilárdsággal
- nagy ezerszem tömeg, sárga magbelső, világos maghéj fehérjében gazdag termés
- kiváló kórokozókval szembeni tolerancia, sőt a fuzáriumos tőelhalással szemben rezisztens változat

## Fajtajellemzők:

Szemtermése értékes fehérjeforrás, mely a növények jó állóképességéből adódóan ütemesen és veszteségektől mentesen betakarítató.

Kirobbanó produktivitás, pergésre nem hajlamos hüvelyek, küllemi- és beltartalmi adottságai révén piacos árumag termés, kimagasló EMT=230-285 (g).

Erőteljes fejlődő, könnyen és jól funkcionáló gyökérgümőkben gazdag gyökérzetet fejlesztő genotípus. A 2019-es év frissen regisztrált új fajtája. Dinamikusan növekvő szaporító területtel rendelkező fajta Európa számos országában.

Jó ellenálló képesség a borsólisztharmat, a borsóperonoszpóra kórokozóival szemben. Rezisztens fajta a fuzáriumos tőelhalás és edénynyaláb károsodást okozó kórokozóval szemben.

# ORCHESTRA

Szárnyaló produktivitás és termésstabilitás

## Termesztési jellemzők:

|                 |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| szemtermés      | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 9 |
| ezermagtömeg    | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 8           |   |
| fehérjetartalom | <div></div> | 2           |             |             |             |             |             |             |   |

## Technológiai jellemzők:

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| javasolt vetésnorma   | 85-90 növény/m <sup>2</sup> ezt jellemzően 95-100 mag/m <sup>2</sup> kivetésével érhetünk el (a vetőmag normát mindenkor a termesztési körülmények és a vetőmag használati értékének függvényében javasoljuk meghatározni, kedvezőtlen körülmények esetén +10% vetőmaggal dolgozzunk) |
| javasolt vetésidő     | akár február végétől vethető, de a fő vetési idő jellemzően a március időszak, akkor amikor a vetés mélységében a talaj hőmérséklete tartósan 6-8 °C                                                                                                                                  |
| javasolt vetésmélység | középkötött és kötött talajokon 5-6 cm, lazább talajokon akár 7-8 cm mély vetés javasolt                                                                                                                                                                                              |


## Növekedési jellemzők:

|                          |             |             |             |             |             |             |   |  |  |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|
| virágzás kezdete         | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 4           |             |             |   |  |  |
| virágzási idő hossza     | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 7 |  |  |
| érésidő                  | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 4           |             |             |   |  |  |
| állóképesség             | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 5           |             |   |  |  |
| betakarításkori magasság | <div></div> | <div></div> | <div></div> | 4           |             |             |   |  |  |

# ORCHESTRA

Szárnyaló produktivitás és termésstabilitás

## Tavaszi takarmányborsó fajták termőképességének vizsgálata



## Tavaszi takarmányborsó fajták termőképességének vizsgálata

