



ATK MGI
MEZŐGAZDASÁGI INTÉZET



MV HÓPEHELY

A tavaszi zaboknál átlagosan 30-40%-kal nagyobb hozama takarmányozási és étkezési célú feldolgozásra is alkalmas. Télállósága, bokrosodása és szárszilárdsága is kiváló.

POTENCIÁLIS TERMŐKÉPESSÉG

6,0 - 8,0 t/ha

Szarvas	6,04 t/ha
Szentés	5,24 t/ha
Nagykónyi	5,26 t/ha

2021. évi terméseredmények

JELLEMZŐ MINŐSÉG

> Hektolitertömeg	52 - 55 kg
> Ezerszemtömeg	33 - 37 g
> Nyersfehérje-tartalom	11,5 - 14,0 %
> β -glükán-tartalom	3,0 - 3,5 %

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG


Lisztharmat	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Koronarozsda	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Szárrozsda	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Levélfoltosság	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TERMESZTÉSI JAVASLAT

Gyomelnyomó képessége a kezdeti fejlődés időszakában kicsi, a tavaszi intenzív növekedési szakaszban kiváló. Csak a tápanyagban gazdag, jó vízellátottságú táblákon szükséges növekedésszabályozása. Vetésfehérítő megjelenése esetén a korai, hatékony védekezés kulcsfontosságú. Vetésideje október 5-20 közötti, 4,0-4,5 millió csíra/ha vetőmagnormával.



ATK MGI
MEZŐGAZDASÁGI INTÉZET



MV KINCSEM

A martonvásári nemesítésű őszi zabok közül a legnagyobb szemtermés elérésére képes, alacsony száru fajta. Takarmányozási és élelmiszeripari felhasználásra egyaránt ajánlott.

POTENCIÁLIS TERMŐKÉPESSÉG

7,5 - 8,5 t/ha

Baracska	3,64 t/ha
Baracska	3,52 t/ha

2021. évi terméseredmények

JELLEMZŐ MINŐSÉG

> Hektolitertömeg	40 - 45 kg
> Ezerszemtömeg	33 - 37 g
> Nyersfehérje-tartalom	11,0 - 13,0 %
> β -glükán-tartalom	3,5 - 4,0 %

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

Lisztharmat	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Koronarozsda	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Szárrozsda	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Levélfoltosság	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TERMESZTÉSI JAVASLAT

Zömök, alacsony szárú, ezért intenzív termesztéstechnológia mellett, tápanyagban gazdag talajon is termesztethető a megdőlés veszélye nélkül. Érést követően mielőbbi betakarítása fontos tényező. Javasolt vetésideje október második - harmadik dékádja, 4,0-4,5 millió csíra/ha vetőmagnormával.